

Toelichting resultaat hygiënogram volgens het vademecum voor de gezondheidskwalificatie, het lastenboek van Belplume en het lastenboek van IKB

Toelichting resultaat hygiënogram volgens het vademecum voor gezondheidskwalificatie en bestrijding Salmonella bij pluimvee			
Staltype	Categorie	Criteria	Beoordeling
grondstal	fokpluimvee	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Betreffende stal opnieuw ontsmetten, door een professioneel ontsmettingsbedrijf, alvorens nieuwe dieren te plaatsen. Na de volgende leegstandsperiode mogen er pas nieuwe dieren worden geplaatst indien de score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten, en nieuw hygiënogram. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
grondstal	gebruikspluimvee	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Op het einde van de volgende leegstandsperiode opnieuw een hygiënogram maken. Na aflevering van een Salmonella positief koppel: *bij neg swabonderzoek: na volgende leegstandperiode opnieuw een hygiënogram maken; *bij positief swabonderzoek: na volgende leegstandperiode hygiënogram en swabonderzoek.
		> 3,0	Op het einde van volgende leegstandsperiode laten ontsmetten door een gespecialiseerd bedrijf en opnieuw een hygiënogram maken. Na aflevering van een positief koppel wordt eveneens op het einde van de volgende leegstandsperiode een swabonderzoek op Salmonella uitgevoerd.
kooistallen	fokpluimvee	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Opnieuw ontsmetten alvorens nieuwe dieren worden geplaatst.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten, en nieuw hygiënogram maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst als de score ≤ 1,5 is.
kooistallen	gebruikspluimvee	≤ 2,0	Akkoord
		> 2,0 en ≤ 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten alvorens nieuwe dieren worden geplaatst.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten, en een nieuw hygiënogram.
rooster- en volière	fokpluimvee	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Opnieuw ontsmetten alvorens nieuwe dieren worden geplaatst.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten, en nieuw hygiënogram maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst als de score ≤ 1,5 is.
rooster-en volière	gebruikspluimvee	≤ 2,0	Akkoord
		> 2,0 en ≤ 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten alvorens nieuwe dieren worden geplaatst.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten en een nieuw hygiënogram.

Bron: vademecum voor gezondheidskwalificatie van en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

Toelichting resultaat hygiënogram volgens het lastenboek Belplume			
Staltype	Categorie	Criteria	Beoordeling
	reproductie	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Er dient opnieuw ontsmet te worden alvorens nieuwe dieren worden geplaatst.
			Na een volgende leegstandsperiode mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten, en nieuw hygiënogram.
			Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
	braadkippen	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Na volgende ronde opnieuw een hygiënogram maken.
		> 3,0	Na volgende ronde laten ontsmetten door gespecialiseerd bedrijf. Eveneens dient opnieuw een hygiënogram gemaakt te worden.
	leghennen	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Er dient opnieuw ontsmet te worden alvorens nieuwe dieren worden geplaatst. Na een volgende leegstandsperiode mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
	opfok leghennen	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Er dient opnieuw ontsmet te worden alvorens nieuwe dieren worden geplaatst. Na een volgende leegstandsperiode mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.

Bron: lastenboeken Belplume

Toelichting resultaat hygiënogram volgens het lastenboek IKB			
Staltype	Categorie	Criteria	Beoordeling
	opfok/fok	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Reinigen en ontsmetten door ontsmettingsbedrijf alvorens nieuwe dieren worden geplaatst. Na eerstvolgende leegstandperiode opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram laten nemen. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien de score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Ondernemer laat stal opnieuw reinigen en ontsmetten en laat een nieuw hygiënogram maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
	vleeskuikens	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Tijdens eerstvolgende leegstandperiode opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram laten maken.
		> 3,0	Tijdens eerstvolgende leegstandperiode opnieuw reinigen en ontsmetten door ontsmettingsbedrijf en nieuw hygiënogram laten maken.
	legghennen	≤ 2,0	Akkoord
		> 2,0 en ≤ 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten door ontsmettingsbedrijf alvorens nieuwe dieren worden geplaatst. Na eerstvolgende leegstandperiode opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram laten maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 2,0 is.
		> 3,0	Ondernemer reinigt en ontsmet stal opnieuw en laat een nieuw hygiënogram maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 2,0 is.
	opfok leg	≤ 1,5	Akkoord
		> 1,5 en ≤ 3,0	Opnieuw reinigen en ontsmetten door ontsmettingsbedrijf alvorens nieuwe dieren worden geplaatst. Na eerstvolgende leegstandperiode opnieuw reinigen en ontsmetten en nieuw hygiënogram laten maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.
		> 3,0	Ondernemer reinigt en ontsmet stal opnieuw en laat een nieuw hygiënogram maken. Er mogen pas nieuwe dieren worden geplaatst indien score ≤ 1,5 is.

Bron: hygiënebesluiten (PPE) 2011